

硝化甘油舌下片使用須知

硝酸甘油片 (NTG)，俗稱救心，其作用為擴張冠狀動脈，緩解心肌缺氧，自覺有胸部不適時，應立即服用。

使用方法

1. 服藥時應坐下或臥姿，避免因副作用引起頭暈而跌倒。
2. 必須舌下含服，含藥時暫不吞口水，隨唾液溶解而吸收，吞嚥服用無效。
3. 通常服藥後約 1~2 分鐘即有效果。如果無效應每隔 5 分鐘可再含一顆，連含三顆若症狀皆未改善時，即應立刻就醫。
4. 含服後若有輕微辛辣感、頭脹、跳動性頭痛是藥物正常反應，短時間即會消失。

藥物保存注意事項

1. 應放在隨手即可取用的地方，外出時也應隨身攜帶。
2. 此藥應儲於原先的不透光玻璃瓶內，請勿自行分裝。使用後務必將蓋子蓋緊，保持乾燥。
3. 注意藥物有效期限，藥物開瓶使用後僅可保存三個月。

成大醫院急診部關心您

國立成功大學醫學院附設醫院 (<https://www.hosp.ncku.edu.tw/nckm/>)

語音預約掛號專線：(06)2766111

人工預約掛號專線：(06)2353333

製作單位：急診部

民國 109 年 07 月修訂

