

疑似登革熱注意事項

登革熱常見症狀

1. 突發性高燒（體溫攝氏 39~40 度，持續 5~6 天）及畏寒。
2. 頭痛、四肢痠痛、骨關節痠痛、肌肉痛、背痛、後眼窩痛。
3. 畏光、虛弱及全身倦怠。
4. 臉部潮紅、結膜充血、噁心、嘔吐、食慾不振。
5. 發燒後期可能出現斑疹，尤其是下肢。

注意事項

1. 登革熱沒有特效藥，感染後約一週退燒，通常於兩週左右自行痊癒。
2. 除了限水病患，請多喝水。
3. 依醫師指示使用退燒藥物。
4. 避免阿斯匹靈（Aspirin）與非類固醇消炎劑（NSAIDs）使用。
5. 加強家中防蚊措施，發病後五日內應預防被病媒蚊叮咬，
病人可睡在蚊帳內。

（續下頁）

登革熱通報

衛生單位接獲通報後（無論是否確診），會立即進行疫情調查及環境擺放藥罐或噴藥，請民眾配合防疫政策。

若有以下情形，請儘速就醫

1. 持續腹痛或嘔吐。
2. 呼吸困難、四肢濕冷、嗜睡或躁動不安。
3. 不正常出血（如流鼻血、解黑便、吐血、咳血、月經血過多等）或皮膚出現出血點。

衛生福利部疾病管制署 Q&A



成 大 醫 院 急 診 部 關 心 您

國立成功大學醫學院附設醫院 (<https://www.hosp.ncku.edu.tw/nckm/>)

語音預約掛號專線：(06)2766111

人工預約掛號專線：(06)2353333

製作單位：急診部

民國 109 年 08 月修訂

